

14 juin 2023

Herbe Hebdo N° 12

Conseil collectif sur la production fourragère à destination des élevages de Côte-d'Or

Les repères pour gérer les prairies

Somme de températures cumulées depuis le 1 ^{er} février (base 0°-18°)	200 - 220 °C *	300 - 350 °C	500 - 550 °C	700 - 800 °C	1000 °C	1200 °C	1400 °C	> 1400 °C
	Apport d'azote	Mise à l'herbe	Fin déprimage Epi 5 cm	Fauche précoce Epi 10 cm – Début épiaison	Foin précoce Début floraison	Foin moyen Floraison	Foin tardif médiocre Début grainage	Grainage

Une pluviométrie faible

Sommes de température et cumul de pluviométrie du au 10 juin			
Station	T° base Février	Pluvio 10j	Pluvio au 10 juin
TAVAU (39)	1381	1	233
CHAMBLANC-SEURRE	1390	1	224
DIJON-LONGVIC	1369	0	228
MONTBARD	1347	1	278
SAINT-ANDRE (89)	1320	6	274
POUILLY-EN-AUXOIS	1285	0	249
JOURS-LES-BAIGNEUX	1249	0	271
SEMUR-EN-AUXOIS	1295	0	226
CHATILLON-SUR-SEINE	1284	3	297
ARNAY-LE-DUC	1260	1	228
TIL-CHATEL	1281	5	243
SAULIEU	1174	0	315
ST-MARTIN-DU MONT	1178	3	290

La récolte de foin continue

Les récoltes de foin sont désormais bien avancées. La qualité des foin qu'il reste à récolter risque d'être inférieur. Le stade début grainage devrait être atteint d'ici la fin de semaine dans presque tous les secteurs.

Les rendements semblent corrects avec des récoltes dans de bonnes conditions.

On constate régulièrement sur les prairies des lots d'animaux qui vont pâturer rapidement après la fauche. Il serait pourtant préférable de laisser un temps de repos suffisant à la prairie (au moins 3 semaines). Malgré les faibles précipitations, certaines plantes arrivent à retrouver une légère croissance et refaire des réserves après la fauche.

Sans cette phase de repos, la prairie aura tendance à perdre de la vigueur et devenir de plus en plus vulnérable à la sécheresse.

Mesures d'herbe

Lieux	Utilisation Type prairie	Hauteur d'herbe au 10 juin (cm)	Croissance (kg MS /ha /jour)
PAGNY LE CHATEAU	Pâturage tournant VL prairie naturelle	16.6	64.4
NOIRON SUR BEZE	Pâturage tournant VL prairie naturelle	10.8	50
ATHIE	Pâturage tournant VA prairie naturelle	5.5	10.2
SEMUR EN AUXOIS	Pâturage tournant VA prairie naturelle	6.4	2
ST MAURICE SUR VINGEANNE	Pâturage tournant VA prairie naturelle	9.3	9.6
BLAISY BAS	Pâturage tournant VA prairie naturelle	6.7	6.2
VILLECOMTE	Pâturage tournant VL prairie naturelle	10	35
CHATELLENOT	Pâturage tournant ovins prairie naturelle	7	5.6
LA ROCHE EN BREUIL	Pâturage tournant VA prairie naturelle	8.2	9.4



Les niveaux de pousse de l'herbe dans les prairies pâturées restent faibles avec une moyenne de 21 kg MS / ha / jour cette première décade.

On constate en parallèle que le niveau des parcelles mesurées a tendance à diminuer progressivement. Il va donc falloir rapidement (si ce n'est déjà fait) redonner de la surface à pâturer afin de décharger les prairies.

14 juin 2023

Herbe Hebdo N° 12

Conseil collectif sur la production fourragère à destination des élevages de Côte-d'Or

Engraissement à l'herbe, les premiers résultats 2023...

En Saône et Loire, quelques éleveurs ont optés pour une ration 100% herbe pour la finition de leurs génisses. Des animaux qui pâturent depuis plusieurs mois sur des prairies naturelles sans complémentation avec un pâturage tournant.

En voici un exemple, *Thierry Preaud*, éleveur en Saône et Loire, engraisse ses génisses à l'herbe avec un pâturage tournant. Les premiers résultats sont là !

Une génisse charolaise lâchée le 13 mars au pâturage avec un poids de 881 kg. 2mois et demi plus tard elle est abattu pour un poids de départ de 928 kg soit un GMQ de 1100gr et une carcasse de 527 kg noté R+ 3.

Et tout cela sans concentré !

Vous êtes invités à la rencontre « Café allaitant » organisé par la Chambre d'Agriculture de Côte d'Or.



Engraissement à l'herbe et pâturage tournant

Le jeudi 15 juin 2023 à partir de 14h sur l'exploitation de Benoit BOUDIER

« Le Boulois »

LA ROCHE EN BRENIL (21530)

Au programme :

- *Tour des parcelles*
- *Observations des animaux*
- *Bilan des performances 2023*
- *Temps d'échanges*

En espérant vous voir nombreux,